



1
Réponse à la Question proposée
Par l'Académie Royale de Chirurgie de Paris
pourquoy certains tumeurs doivent estre entièrement
extirpées; et d'autres simplement ouverte, quel soit
les cas dans l'une et l'autre operation que le cauterre
est preferable à l'instrument tranchant, et les raisons
de cette preference: Composé par le Licenté Jacques
Escanilla maître chirurgien du College de la Ville
de Saragosa Royaume d'Aragon.

Première Question pourquoy certains tumeurs doivent
estre entièrement extirpées.

1.^o Comme dans les abcès formez par la flegme. Je
comprend les Strumes, glandules, ganglios, nodos,
Loupies, Testicules, Calvarias, Atheromas, & Scatomas
Et Melicerides &c. je respondray premierement des Strumes
pour donner plus de facilité à respondre de tous les autres
autres abcès impropres: doivent estre entièrement extirpées
Les Excroissances qui ne se peuvent pas rebondir ny supurer,
puisqu'il est certain que l'intention du chirurgien doit estre
d'intenter la resolution, puisque c'en la meilleur de toutes les
autres terminaisons. parce que d'elle ne s'en suit rien de dangereux
Et comme le chirurgien est obligé de guerir les maladies avec
le moins de douleur qu'il lui est possible, mais cela se doit
entendre d'abord que le corps est évacué de la cause qui
produit les Excroissances, car autrement on ne pourra
surprendre la resolution; en los quelles ne se peuvent
rebondir &c. le chirurgien est obligé d'intenter la suppuration
puisqu'en c'en sortir d'abcès est la meilleur terminaison
après la resolution, avec la précaution de ne les pas ouvrir

avant d'estre entièrement suppuré, par le quel le contraire
en resultera une vlcere difficile à guerir.

ARC 1301

Nº 9 C



Doivent être entièrement extirpées les Eserophules quand le chirurgien
 les trouve superficielles et se meuvent avec grande facilité
 et sont situées sous la peau parce que de cette extirpation
 ne s'en suit aucune chose dangereuse comme flux de sang
 ny autres accidents: Doivent être entièrement extirpées parce que
 l'intention du chirurgien doit être d'aller jusqu'à la racine parce
 que cette espèce de tumeurs se trouve enfermée dans une
 membrane, l'intention doit être d'extirper non seulement la
 glande mais aussi la tunique qui la renferme et si ne
 fait de cette façon reviendra de nouveau à bray, parce que
 de quelques portions de la membrane qui aura resté, la raison
 est que comme la membrane n'est pas partie du corps sinon
 engendrée du même humeur qui engendre les Eserophules, c'est
 pour cela que si en sorte quelque portions de la partie malade
 laisse une mauvaise disposition en elle, capable de pouvoir
 allumer le flux de nouveau comme s'explique avec ce proverbe,
Curtius parba igne scintilla contempta magnum excitabit incendium

Senatus lib. 5. cap.
 25. pars 1.

Doivent être entièrement extirpées quand elles sont malignes
 parce qu'elles ont la nature des Strumes et Cancres comme nous
 démontrons l'expérience, et ne se pouvant pas résoudre doivent
 s'extirper puisque nous voyons chaque jour d'heureux succès
 de l'extirpation de ces espèces de tumeurs. Doivent être aussi
 entièrement extirpées d'abord qu'on ne trouve rien qui s'oppose à
 2. l'extirpation. parce que le chirurgien querrira avec plus de facilité
 une Eserophule que planeur, soit superficielle, soit profonde,
 celles qui n'ont point de douleur, que celles qui sont douloureuses,
 parce que celles qui sont accompagnées de douleur sont plus
 mauvaises, et celle cy sont sielles sont situées au col, aux
 aînes, et aux Essaites; il y a plus de danger, que si elle se
 trouve aux jambes, et celle cy se guérira plus facilement que celle
 qui se trouve aux articulations, celles qui ne proviennent de maladie
 se guérissent plus facilement que celle qui en proviennent
 comme par exemple si on est attaqué de la verrue le Eserophule
 ne se guérira jamais si on ne détruit la cause qui la produit
 Les Strumes qui commencent à paroître peuvent être mieux
 guéries que celles qui sont anciennes, parce que la première

Parus lib. 14. cap. 25
 in margine.

ACADEMIE ROYALE
LE
CHIRURGE

peut se guérir ou l'extirper plus facilement que la seconde.
aux Infans cette maladie se guérit plus facilement que dans les
adultes, et les premiers sont plus sujet à ces sortes de maladies
que les seconds.

Abces et ces especes

Les Altheromes, Steatomes, et Melicerides et les Hygmes
doivent estre Extirpés par les mêmes raisons que les Strumes,
puisqu'ils guérissent en la même en ce qu'il n'y arien en danger
mais ne se guérissent pas facilement, elles se distinguent de
autres en deux cas, le premier est que ces abcs ne sont jamais
malins parce qu'ils ne deviennent pas cancéreux, 2^e quand ces abcs
se trouvent a la teste avec du vice aux os du crâne en ces
nous devons gratter la partie de l'os infectée, et selon ne s'y prend
de cette façon l'ulcere ne s'guérira jamais, et si l'os est corré
considérablement il vaut mieux l'abandonner que de l'entreprendre
mais si n'y a point de corré a l'os du crâne s'guérira avec
grande facilité, et si ces sortes de tumeurs sont élevés et sont
capable de se renouveler sont plus facile à guérir que celles qui sont
applaties et ont les racines profondes par ce que celle cy sont plus
sujettes en l'opération aux flux de sang et aux ponctures de nerfs,
c'est pour cela que le Chirurgien doit estre un bon anatomiste.

3. Doivent estre Extirpés les Cancers puisqu'ils ne se peuvent repandre
d'abord que celui cy n'est pas ~~oculte~~ par ce que si est oculte
et qu'il l'extirpe s'insinuer la mort, non seulement s'entend par
oculte ceux qui se trouvent et situés dans le corps comme
par exemple a la matrice interstin, col de la Vessie, foye, rate,
et aussi celle qui se trouve en partie profonde parce que
l'expérience nous a démontré que pour aucunes raisons ne doit
Extirper puisqu'ils tous les malades en meurent, et si quelques
Chirurgiens vous tentent couper ou bruler une semblable tumeur a la
bouche ou fondement ou a la matrice ne pourra jamais cicatrifer
l'ulcere et le malade vivra toujours tourmenté, et a la fin mourra
Extenué, mais avec la cure Palliative vivra quelques années avec
moindre peine.

Doivent estre Extirpés quand il commencent a se former et sont
superficiels parce qu'en ce temps là les racines ne sont profondes,
mais pour cela il faut que le malade soit robuste bien déterminé et
qu'il ne soit point faible de quelques maladies et qu'il n'y point



Suppression d'hémorroides et que si en femmes ou filles quelle
soit bien réglée, si un de ces cas y manque et qu'on ait guéri
par cette opération la tumeur reviendra de nouveau comme j'eloy
vû a une Dame qu'on a extirpé un cancer au sein droit et d'abord
qu'il a esté guéri de se seint en est venu un autre au sein gauche;
C'est pour cela qu'il est nécessaire avant d'entreprendre ces opérations
d'évacuer le coeur des humeurs qui peuvent estre capable d'y produire
comme par exemple de l'humeur mélancolique, et de cette façon le
Chirurgien viendra a bout de la guérison de pareil maladie d'abord
que le cancer sera extirpé jusqu'à sa racine, parce que si en reste
quelques portions viendra de nouveau, et le même se doit entendre
de l'escrofulade cancéreuse.

Seconde reponse

Tous les abcès doivent estre ouverts quand ils sont suppurez,
à l'exception de ceux qui se trouvent a l'oeil, Testicules, foye,
Rate et poulmon, puisqu'en ce cas se doit empêcher la supuration
Intente l'induration pour prévenir les accidens qui peuvent
survenir. Tous les autres abcès doivent estre ouverts et
quelques uns avant d'estre entièrement suppuré par ce qu'il
y a d'angere d'attendre la par faite supuration, et sont les
suivants premièrement quand la chaleur naturel est foible
pour avoir souffert de grande douleur, Vigilia ou autre chose,
Lesquelles nous mettent en suspect que le malade peut périr
avant d'estre suppuré ou que le membre qui occupe les tumeurs
puisse tomber en mortification. en pareil cas se doit ouvrir
avant d'estre suppuré et le même se doit faire quand l'humeur
est de mauvaise qualité. 2^e. quand la matiere est en grande
quantité, que la nature semble ne le pouvoir supporter en
pareil cas la maladie a plus de force que la nature. C'est pour
cela que l'abcès se doit ouvrir parce que les chaleurs naturels est
foibles pour pouvoir supurer toute quantité de matiere,
Et en ce cas selon l'application des médicaments suppurants
l'on est certain de la mortification, c'est pour cela que le
Chirurgien doit tenter la ventilation par le moyen de la par
portion de l'abcès parce que en pareil cas l'abcès doit avoir une
grande tention celle qui a empêché l'opération plutôt. 3^e. quand
la matiere est épaisse, profonde, et attachée a la partie malade

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

Et spécialement la chaleur naturelle est faible, en pareil cas il doit
ouvrir parce qu'il ne pourra pas se suppurer, spécialement si quelques
chirurgiens y appliquent des trepanctions fortes ou médicaments narcotiques,
pour appaiser quelques grandes douleurs, pour lors la chaleur naturelle ne
pourra cuire l'humeur et la partie tombera en mortification. 4.° quand le
membre commence à se mortifier le chirurgien doit ôter le Suppuratif et continuer
la guérison comme un membre mortifié qui est douloureux sans attente. 5.° d'après
abcès venimeux doivent être d'abord ouverts pour donner issue à la matière
venimeuse, et pour pouvoir faire pénétrer les médicaments qu'on y applique
pour débarrasser le veau, de crainte que ce venin ne retrocede de la partie
interne à la partie externe en ce cas la nature ne pourra vaincre la matière
qui forme le thumeur. 6.° quand la thumeur se trouve près d'un membre principal
comme les lymphatiques à la poitrine, au foie, au bas ventre, en pareil cas si on
attend la parfaite suppuration le malade en mourra ou si l'abcès s'ouvre
par lui-même comme nous démontrons l'expérience. parce que la matière
ronge et déchire la membrane qui couvre les parties et laisse une vlcère de
mauvaise qualité, ce qui n'arrivera pas si ces abcès s'ouvrent avant la
parfaite suppuration par le moyen de la parfaite opération de cette
façon le chirurgien aura beaucoup plus de chance de la guérison du malade.
7.° quand l'abcès est proche des articulations il est nécessaire de les ouvrir
d'abord de crainte que la matière ne se filtre dans l'articulation et au ligaments
car l'abcès seroit difficile à guérir et le malade en restera infirme, et le
membre se doit entendre quand il est proche d'un os ou membrane ou d'un
membre sous lequel il y ait une concavité comme le bas ventre ou la
poitrine en ce cas il doit ouvrir de crainte que la matière ne pénètre les
parties contenues dans ces cavités. 8.° quand l'abcès se trouve par des os la
matière causera la carie c'est pour cela qu'on le doit ouvrir avant d'être
entièrement suppuré spécialement si ces abcès se trouvent à l'os
externe parce qu'il amoins de résistance que les autres. 9.° quand l'abcès
se trouve dans des parties faibles et corrompues comme par exemple
les Perinée ou l'apex qui se trouve entre les Testicules et l'anus parce que
en cette endroit si on attend la parfaite suppuration il restera une fistule
et si il arrive d'ouvrir avant la suppuration il pourra en arriver la
même chose.

Tous les autres abcès doivent être ouverts d'abord qu'ils ont suppuré, mais
cela se doit entendre quand ils ne peuvent se résoudre, et pour cela que
l'abcès ne soit pas grand sinon petit, de matière légère benigne et
non maligne, et qu'il soit superficiel afin que la vertu du résolutif
puisse arriver à l'endroit de la matière, et que le malade soit robuste
ces abcès se résoudront mieux en peu de temps parce que les pores
se trouvent plus ouverts, voilà la raison pour quoy aux enfans
il se suppurent plus facilement que de se résoudre et cela arrive
parce qu'ils ont la peau plus tendre et serrée.

Tous les autres abcès doivent être ouverts d'abord que le pus en forme, et pour cela
il faut considérer sept préceptes 1.° qu'il la portion d'os fautive en l'endroit de la
matière. 2.° quelle se fasse à la partie déclive pour que la matière sorte avec
plus de facilité. 3.° quelle se fasse suivant la longueur des parties musculaires



en suivant les structures des muscles pas ce que les incisions change proportion
 de la partie qui se doit faire. 4. que le chirurgien prenne garde de blesser
 quelques artères, nerfs, ou tendons en pour cela que le chirurgien doit être bon
 anatomiste. 5. que la matière ne sorte toute à la fois spécialement si l'abcès
 est grand. 6. que l'incision soit faite avec promptitude & sécurité et avec le
 moins de douleur qui se puisse et pour cela il faut que le chirurgien aye
 présents trois conditions 1. qu'il fasse l'opération d'un coup d'un seul trait
 qu'il ne la puisse faire ainsi qu'il prenne garde d'augmenter la maladie & qu'il
 soit guéri de façon que la maladie ne revienne, et pour cette raison doivent
 être extirpées entièrement les Excroissances & ne laisser aucune portion de la
 tunique qui l'enveloppe, le même se doit entendre des alarones & de la tumeur
 qu'il se forme et tous ceux qui sont composés de tunique, les cancers doivent
 être cauterisés pour ôter le mauvais levain qui reste de la partie cancéreuse
 et la même se doit faire aux polypes cancéreux et ramulés et si ne
 fait pas cela la maladie revient une autre fois comme l'expérience nous
 le démontre et vérifie les auteurs. 7. que après avoir ouvert l'abcès s'aperçoive
 la douleur qui a été occasionnée par l'opération, par ce qu'il y a de pus
 d'écoulement qui rendent le corps plus faible, que les douleurs et après l'ulcère se
 gueriront avec quatre intentions. quelques auteurs comme Dionysiodase
 et Antonio Robledo nous donnent d'autres préceptes et disent qu'il y a des
 qui sont grands il faut faire une incision grande et quand il est petit
 l'incision petite, mais je dis que cela ne convient pas par ce que si un
 abcès grand se fait une incision pareille la matière en sortira toute à la fois
 et suivra la mort du malade par la dissipation qui se fait des esprits
 comme il en arrive à un chirurgien de mon pays qui a ouvert un abcès qui
 occupoit depuis l'aîne droite jusqu'au tarse du pied. Ayant fait l'incision grande
 la matière en est sortie tout d'un coup et d'abord qu'il comprit que l'incision étoit
 trop grande il fut obligé de faire deux points de suture pour arrêter la
 matière qui en sortoit toute à la fois après il mit le membre en bonne
 situation & fut que la matière en sortit peu à peu sans causer grande dissipation
 d'esprit et le malade a guéri entièrement ce qui pour être n'aurait pas arrivé
 si la matière avoit sortie tout d'un coup, en pour cela que je ne prouve pas
 aux grands abcès l'incision proportion.

Dazalib. 1. cap.
 37. Robledo tra.
 3. Section 5.

avec les sept précautions nous pourrions ouvrir les abcès d'abord qu'il seroit
 suppuré, ce que connoitra le chirurgien par l'attatation, fièvre, pulsation,
 & douleurs et chaleur. Dès que tous ces accidents seront dissipés ce sera un signe
 que le pus est fait, ce qui se connoit aussi par le tact, mais si l'abcès
 est profond et la matière grossière ne sera pas facile de le connoître par
 le toucher même, ce qui se pourra juger par les accidents qui auront précédés
 L'abcès s'ouvrira une fois avec l'instrument tranchant et autre fois avec le
 cauthère actuelle ou potentielle. avec le cauthère potentielle quand le malade
 a peu de l'instrument tranchant mais cela se doit entendre quand l'abcès est
 superficielle, que si est profond il ne peut s'ouvrir avec le scarotique
 parce qu'il faudroit du temps pour arriver à l'endroit de la matière, et si
 la matière en corrodive augmentera la force, il est vrai que Lazarillo
 Riverius dit qu'il a ouvert une tumeur située au bas ventre avec le scarotique
 qui contenoit vingt livres de matière mais je crois que cette opération aura été faite
 avec le cauthère potentielle parce que la matière s'en trouva superficielle
 ce que j'ai trouvé contre toute règle de chirurgie d'ouvrir les abcès avec le
 cauthère potentielle, parce qu'en cet endroit doit être l'instrument tranchant
 ce qui doit ouvrir les abcès par ce qu'il n'y a à craindre de grands artères de veines ou de
 nerf.

Riverius fol. 578.
 abcessus a. d. dominis.

Pareus lib. 18.

cap. 27

Arelleano cap. 10.

fol. 119.

ACADEMIE ROYALE

CHIRURGE

Pour répondre à cette 3^e question nous devons supposer qu'il y a
 beaucoup de différentes façons de cautériser, ceux qui dépendent plutôt
 du genre du chirurgien que de la description qu'en font les auteurs.
 Comme dit Jean Baptiste Arelleano et Ambrosius Pareus. quod
 de actualia cauteria attinet, horum tanta est in figura varietas ut
 definire ne queat, multo minus scribi. et tous les cautères corroborent
 les membres où il s'appliquent, empêchant que la corruption n'agisse
 résout la matière renfermée et la jette dehors comme nous voyons
 aux Empiématuriques que pour être faible ne se peuvent ouvrir,
 empêchant le flux de sang et les accidents et la poncture des nerfs,
 extirpent tout ce qui est étranger et de mauvaise qualité.
 Avec cette supposition je répond premièrement que les Scrophules
 comme dit Fabricius aqua pendenté doivent être extirpées, si survient
 un flux de sang se doit supprimer avec des charpies brulées et sans
 brulée mêlée avec un blanc d'oeuf bien battu et des poudres resstringentes,
 et si avec ces médicaments le flux de sang ne s'arrête l'opération
 ne se doit suivre jusqu'à ce que le flux de sang ne soit arrêté.
 D'abord qu'il n'y aura pas cette inconvénient l'opération se pourroit faire
 une seconde fois et si arrive un flux de sang dit le même auteur
 qu'on ne fasse point l'opération. mais je ne m'accorde point
 au commandement de cet auteur pas ce qu'il n'y joint de raison
 pour dire qu'il se fasse l'opération une seconde fois puis qu'en ce
 cas le flux de sang est plus sûr parce qu'il ne se pourra pas
 arrêter avec facilité et spécialement si vient d'une veine jugulaire
 ou artère carotide. puisque ses vaisseaux ne peuvent être liés avec
 facilité pas ce que la glande qui doit être extirpée l'embarasse ou
 l'empêche, et en ce cas se doit servir du cautère. et en ce cas le
 chirurgien ne se trouve pas avec des cautères proportionnés à cette
 opération le chirurgien doit réunir la plaie avec couture et
 après seconde fois qu'il guérira le malade doit cautériser avec des cautères
 proportionnés, et si par le moyen de ces cautères il peut détacher
 la Scrophule proche le vaisseau en ce cas peut lier la Scrophule avec
 la racine d'une herbe qui s'appelle Turbica le plus profond qu'il
 pourra et pas se mouvoir la pourra arracher avec grande facilité et
 sans rien craindre. mais si la Scrophule n'estoit séparée que d'un
 côté l'on en coupera la moitié et à la portion qui restera s'appliquera
 le cautère que nous démontré Petrus Lopez de L'Yon qui dit qu'il
 les arrache sans douleur et sans craindre flux de sang. c'est pour
 cela que le cautère est préférable en ce cas puisque l'instrument
 sert seulement à se parer, mais le cautère sert à corriger les
 accidents que l'instrument tranchant a causé.
 Et les Scrophules malignes non celle que nous appelons
 Cancerentes sinon celle qui se trouvent entrelassées de vaisseau
 et qui se trouvent proche des grands vaisseaux, l'instrument
 tranchant ne sert de rien parce que si l'on en sert pour faire
 l'opération causera un flux de sang, et en ce cas pour les extirper
 il est mieux de se servir de cautère jusqu'à ce que pénétrera la
 substance des Scrophules, nous pouvons aussi nous servir de



ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

Cauterre en forme de chandelle comme celle dont on se sert pour
l'expression d'urine, ce cauterre doit penetrer jusqu'à la moitié
des Escrophules, et après s'en être appliqué une Escarotique qui ne
cause douleur ny inflammation ny d'autres accidents, quelques un
s'appliquent le Solimeu corrodif avec petite quantité, mais Mouffitanus
dit qu'il ne convient point pour les facheux accidents qu'il occasionne
quoiqu'on y applique du deffensif en ce cas le cauterre est preferable
parce que l'instrument tranchant ne sert de rien

En des Atheromes, et Neatomes, et Meliceris on y preffere le cauterre
et speciallement s'il se trouve profondes et s'il y a des grands vaisseaux
comme veines, Arterres, et nerfs dessous, ou s'ils se trouvent attachés
à ces mêmes vaisseaux, puisque selon faire l'extirpation avec l'instrument
tranchant il y a à craindre un flux de sang aux junctures des nerfs,
ce qui arrivera sûrement s'il se trouvent attachés aux vaisseaux. S'il
est par la partie interne, et en ce cas s'en doit faire une incision en la
partie inferieure avec le cauterre pour faire sortir la matiere qui
contient dans les deux thumeurs atheromes, et Meliceris, parce qu'ils
renferment des matieres liquides et qu'avec facilité sort par l'incision,
et après avec des medecaments se fait l'extirpation de la tunique qui enveloppe
la matiere qui contient cette thumeur, mais les Neatomes l'incision
se peut faire à la partie superieure et moyenne parce que la matiere
qu'il contient est epaisse et grossiere plus que celles qui se trouvent dans les
autres, mais s'il se trouve proche des vaisseaux qu'il y en a à craindre
flux de sang doivent être ouverts avec le cauterre actuelle, j'en dis
quelles incisions soient petites parce que si l'on extirpe totalement

hypocrates 2. lib.
predictionum.

Parus lib. 6. cap. 19.

Ambrosius Pareus mais si ces tumeurs sont petites l'extirpation se peut
faire avec l'instrument, parce que quelques fois le
malade ne veut pas permettre l'extirpation, en ce cas il convient de cauterer
superficiellement à l'entour de ces tumeurs afin que la matiere qu'il contient
sorte ce que nous sommes obligé de faire quand nous trouvons un Sige
faible. La ranul se guerit avec le cauterre parfaitement et empêche
le flux de sang et ne revient plus. La description du cauterre se trouve
en Pareus.

lib. cap. 5.

lib. 16. cap. 45.

Aux cancers et les Escrophules canceruses on se peut bien servir de
l'instrument tranchant pour separer le cancer de ces especes, quoique
Aetius dit qu'on ne doit cauterer et qu'il est suffisant de comprimer jusqu'à
la partie Seine parce qu'il n'y a à craindre flux de sang quand il est dur
depuis son commencement et est utile à la manuelle des femmes. mais cette
pratique ne se doit pas observer parce qu'elle est contre les regles de la chirurgie
puisqu'il en est certain qu'ils ne peuvent être extirpés sans cauterer, et le même
Aetius dit au même livre quel cauterre se jette pour empêcher le flux

lib. 16. cap. 34.

lib. 1. cap. 20.

de sang, et pour ôter le mal le vain du cancer et cela est le plus vrai
semblable. et Reccius dit *Postea ignitis ferramentis adurendum*
non solum ad sanguinem extendendum et lib. 3. Continentis Sicilicet
Rafis, sed etiam ad canceri venenatam qualitatem absumendum
et etiam dicit Albucares qu'il en est certain qu'il se doit cauterer,
parce que les entours le vain qu'il y a à la partie canceruse en pourroient

engendré d'autres, et le même se doit entendre de l'escroquille cancerus
 Lib. 2. cap. 7. **PARADISE** **ROYAUME** du Joannes de Vigo, et le même se doit entendre du polype
 cancerus lesquels se doivent se parer avec l'instrument tranchant, et
 apres se doit servir du cautere pour detruire les racines, c'est pour
 cela que le cautere est preferable a l'instrument tranchant.
 aux glos qu'on ne doit pas attendre la parfaite supuration le cautere
 est preferable en la plus part de ces cas. 1. se fera des scarifications
 pour faire sortir partie de l'humour qui presse la nature, et pour pouvoir
 faire penetrer les medecaments; et pour quoy les choleux naturels se voyent
 et il se voit que cela ne soit pas suffisant et quoy craigne que la
 partie puisse tomber en mortification donc se cautere, afin de
 corroborer la partie qui se trouve faible, et pour consumer partie de
 l'humour qui se trouve a la partie et en ce cas se fera penetrer le cautere
 a tout ce qui sera possible pour en garder quil ne vienne un flux de sang
 ny autres accidens. 2. se doit faire aussi des scarifications parce que ordinairement
 si trouve des tumeurs, mais au commencement se feront superficielles,
 et en cas que cela ne suffise elles se feront plus profondes, et si avec tout
 cela le malade ne se trouve mieux il sera necessaire de cauteriser
 avec des cauteres actuels par les memes raisons que nous avons diles dessus.
 3. en ce cas le cautere est preferable quand il est de nature froide,
 et se connoit quelle chaleur naturelle n'a point de force pour supurer
 ces matieres et spécialement aux jointures ou articulations, et en ce cas
 l'operation avec l'instrument tranchant n'est pas si rare comme dit Serapion
 pour raison des parties qui composent les articulations c'est pour cela qu'on
 a inventé le cautere actuel comme du Joannes d'aptista de ces sortes
 de cauteres que le chirurgien doit se servir en tumeurs de matiere froide
 spécialement aux articulations. 4. Quand la partie commence a se mortifier,
 et l'instrument tranchant sert seulement a se parer, mais le cautere guerit
 Hippocrates, que quunque medicamentis non curant, ferrum curat que
 ferro non curantur ignis curat, que igne non curantur ea exsternare
 oportet inmedicabilia Musitanus omnes chirurgi nemine excepto
 prius emortuam partem instrumenta appropriata secant deinde igne
 actuali eam tractant. 5. cas est quand la matiere est venimeuse vous
 devez faire scarification pour faire sortir ladite matiere, et pour
 que les medecaments puissent mieux penetrer, et que le venin ne se
 communique a la partie interne, quelques uns y applique des scarotides
 mais je trouve plus a propos le cautere actuel parce que le feu est le
 destructeur de tout et corrobore la partie et ce que ne puis faire le
 scarotique. Pareil du cautere actualis preferimus potentialibus.
 6. cas quand se trouve proche du membre principal se doivent
 cauteriser comme il se voit aux Parotides malignes, parce que
 le feu detruit la malignite et que la malignite ne se supure
 jamais, et pour quoy ne se fasse une retrogradation a la partie principal
 sont profondes pour éviter le flux de sang, aux abces du foye le cautere
 est preferable a cause du flux de sang qui peut survenir, et le cautere
 doit estre petit et courbe comme du Petrus Lopez de Lyon, laquelle
 du avoit fait beaucoup de ses operations avant que le tumeur fut
 entièrement suppuree avec le cautere que nous avons diles dessus.

Lib. 5. part. 11. cap.

12
arellano fol. 119.

7 apl. 91.

lib. de thumos. cap.

10.



Lib. 14. cap. 27.

Lib. 3. cap. 12.

ACADEMIE ROYALE
DE CHIRURGIE

et qu'il n'ait en arrivant jamais flux de sang et qu'il y a eu très peu de
malade qui soit guéri par cette opération. Le même dit des Empièmes
que l'opération se doit faire avec le cautère pour éviter le flux de sang;
de la raison pour quoi il ouvre les abcès du foie avant que d'être
entièrement suppuré et pourvu que la suppuration ne touche la membrane
propre de ces Vaisseaux, Siles Empièmes sont grandes le malade meurt
suffoqué, c'est pour cela qu'il est mieux de les ouvrir avant d'être

Riverius lib. 7. cap.
4.

Lib. 7. cap. 10.

suppurés comme dit Riverius ac vero multo utilius est abscessum qui
pleuritide succedit aperire antequam disrumpatur, et pus in thoracis
cavitationem effluat. Ambrosius Pareus dit quelle doit être le cautère pour
ouvrir les abcès de la poitrine. ce qui est préférable en certains cas et
spécialement si la tumeur est profonde, pour raison des parties qui peuvent
être lésées par les instruments tranchants et augmenter la maladie; il y en a d'autres qui
cauterisent superficiellement les espèces d'abcès et on en guérit beaucoup, d'autres
y appliquent des scarotiques parce que le malade ne veut permettre l'opération

Pareus lib. 18. cap. 27

manuel ce qui n'est pas une bonne pratique on peut offenser les parties voisines
comme dit Pareus caustica potentialia temere partes vicinas laesunt et
con tactu violent, que temeritas dolores vehementes, inflammationes et alia huiusmodi
symptomata accerseret. et c'est pour cela qu'on ne doit appliquer des scarotiques
ni se servir d'instruments tranchants, mais seulement du cautère, ces espèces
de tumeurs viennent ordinairement avec qui sont verrouillés et ne guérissent
jamais si l'on ne détruit la cause qui les produit et c'est pour cette raison
qu'il reste ordinairement des fistules Pareus marginaria particularia huiusmodi
vitia, nisi generali remedio non sanantur, et c'est pour cela qu'il les doivent être
évacués avant qu'ils se suppurent, et s'ils se suppurent se doivent cauteriser, ou
les ouvrir avec des instruments tranchants, mais le cautère vaut mieux.

Pareus lib. 18. cap.
28.

Senertus lib. 2. part. 2.
cap. 19.

Tous les autres abcès doivent être ouverts d'abord qu'ils ont suppuré, et s'ils sont avec
instruments tranchants au moins qu'ils ne soient en partie profonde, articulation,
parties nerveuses, tendineuses, ou près de quelque grand vaisseau, et s'ils sont
dans les parties musculaires. Sicut tamen Spe Senertus fieri non potest
ob nervos, musculos, tendines, arterias, et venas majores parce que son blessé
avec des instruments tranchants on s'expose à la pénétration de sang et d'autres
accidents, au contraire si l'on ouvre avec le cautère on évite tous ces accidents,
mais si ces tumeurs se trouvent superficielles et sont petites si peuvent
être ouvertes avec des instruments tranchants au moins qu'elle ne soit compliquée
avec quelque un des accidents que nous avons dit ci-dessus parce qu'en ce
cas des instruments tranchants ne font rien. il y en a d'autres qui ouvrent ces
abcès avec des cautères potentiels, mais le cautère actuel est préférable

Pareus lib. 18. cap. 27

comme dit Pareus Caustica actualia preferenda potentialibus, puis que ceux
qui sont plus dangereux que propre quoique le malade le demande
si même que la tumeur soit profonde.

Senertus lib. 2. part. 2.
cap. 19.

tous les empîèmes se guérissent d'une même façon et il s'en peut faire de
quatre façons Senertus. 1. Ex pleuritide non satis expurgata. 2. apertita
ad cavitationem thoracis a pectore defluens. 3. Ex vena in thorace rupta. 4.
Ex vena in pectore aperta; et si cela ne soit pas le craché d'urine

Riverius lib. 7. cap.
4.

ou du lait doit être ouvert, quoique par là il est difficile
comme dit Riverius hoc raro si puris late per alium aut
vicinas evacuationes, et en ce cas le cautère actuel est préférable à
des instruments tranchants parce que ce dernier occasionnerait un flux de sang
ce que ne fera pas l'autre et l'opération se fera plus facilement Pareus

Pareus lib. 7. cap. 10.

tuto et facile perficitur illa appertio actuali hoc cauterio. quoique quelque fois
ne s'en peut pas parce que le malade est trop faible pour raison de la grande

Escavilla

46.4